Chapitre 15 : Les nombres complexes (2)

1 Module et arguments d'un nombre complexe

Dans toute la suite, $(O, \vec{u}, \vec{v})$ est un repère orthonormal du plan complexe.

Définition 1 : coordonnées polaires

Soit M un point du plan complexe. On peut repérer M par ses coordonnées cartésiennes $(x; y)$ dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

Si $M \neq O$, le point M est parfaitement repéré par la distance r qui le sépare à l'origine du repère et par une mesure θ de l'angle orienté $(\vec{u}; \overrightarrow{OM})$.

Le couple $(r; \theta)$ constitue les coordonnées polaires de M .

Remarque : r est unique, contrairement à θ qui est défini à $2k\pi$ près ($k \in \mathbb{Z}$).

Exemple 1

1. Après avoir placé les points dans un repère, déterminer les coordonnées polaires des points $A(3, 0)$, $B(0, -2)$, $C(1, 1)$, $D(-5, 0)$, $E(0, 1)$, $F(1, \sqrt{3})$ et $G(-3, 3)$.
2. Après avoir placé les points dans un repère, déterminer les coordonnées cartésiennes des points $M[3, \pi]$, $N[2, \pi]$, $P[1, \frac{\pi}{4}]$, $Q[\frac{3}{2}, \frac{5\pi}{6}]$, $R[4, -\frac{\pi}{3}]$ et $S[2, \frac{3\pi}{4}]$.

Définition 2 : module d'un nombre complexe

Soit z un nombre complexe de forme algébrique $z = x + iy$ (x et y réels).

Le module de z est le nombre positif noté $|z|$ et défini par $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

Remarques :

- Le module de z représente la distance OM où M est l'image de z .
- Si z est réel alors le module de z est sa valeur absolue.
- $|z| = 0$ équivaut à $z = 0$.
- $z\bar{z} = x^2 + y^2 = |z|^2$.

Définition 3 : arguments d'un nombre complexe

Soit z un nombre complexe non nul de forme algébrique $z = x + iy$ (x et y réels) et M son image dans le plan complexe.

Un argument de z est une mesure de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$.

Si θ est un argument de z alors on note $\arg(z) = \theta$.

Remarque :

Le complexe 0 n'a pas d'argument.

En résumé :

Propriété 1 : changement de coordonnées

1. Soit $(r; \theta)$ les coordonnées polaires d'un point $M \neq O$ du plan complexe. Alors ses coordonnées cartésiennes sont $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$.
2. Soit $(x; y)$ les coordonnées cartésiennes d'un point $M \neq O$ dans le plan complexe. Alors on a $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ et $\theta = \arg(z)$ est tel que $\cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ et $\sin \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$.
3. Deux nombres complexes non nuls sont égaux si et seulement si ils ont le même module et le même argument à un multiple de 2π près.

Définition 4 : forme trigonométrique d'un nombre complexe

Soit z un nombre complexe non nul de coordonnées polaires $[r; \theta]$; Alors l'écriture $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ est appelée forme trigonométrique du complexe z .

Notation : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ est noté $[r; \theta]$;

Exemple 2

Déterminer la forme trigonométrique de :

1. $z_1 = 1 + i$
2. $z_2 = 3i$
3. $z_3 = -7$
4. $z_4 = 2 - 2i$
5. $z_5 = -1 + i\sqrt{3}$
6. $z_6 = \sqrt{6} + i\sqrt{2}$
7. $z_7 = 5 - 5i$
8. $z_8 = 6\sqrt{3} - 6i$

Propriété 2 : propriétés du module et de l'argument

1. Pour tout nombre complexe z non nul, on a $|\bar{z}| = |z|$ et $\arg(\bar{z}) = -\arg(z)$.
2. Pour tout nombre complexe z non nul, on a $|-z| = |z|$ et $\arg(-z) = \arg(z) + \pi$.
3. Pour tout nombre complexe z non nul, on a z est réel $\iff \arg(z) = 0 + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
4. Pour tout nombre complexe z non nul, on a z est imaginaire pur $\iff \arg(z) = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Propriété 3 : module et argument d'un produit ou quotient

1. Pour tous nombres complexes z et z' , on a $|z + z'| \leq |z| + |z'|$ (*Inégalité triangulaire*).
2. Pour tout nombre complexe z et z' non nuls, on a $|z.z'| = |z|.|z'|$ et $\arg(z.z') = \arg(z) + \arg(z')$.
3. Pour tout nombre complexe z non nul et tout entier naturel n non nul, on a $|z^n| = |z|^n$ et $\arg(z^n) = n.\arg(z)$.
4. Pour tous nombres complexes z et z' non nuls, on a $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$ et $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z')$.

Avec la notation précédente :

$$[r; \theta] \cdot [r'; \theta'] = [r.r'; \theta + \theta'].$$

$$[r; \theta]^n = [r^n; n\theta].$$

$$\frac{[r; \theta]}{[r'; \theta']} = \left[\frac{r}{r'}; \theta - \theta' \right].$$

Exemple 3

1. On considère le complexe $z = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Écrire le nombre complexe $Z = z^{2018}$ sous forme trigonométrique et en déduire sa forme algébrique.

2. Même question avec $z = (1 + i)^{2020}$

3. On considère les nombres complexes $z_1 = \sqrt{3} - i$, $z_2 = 1 - i$ et $Z = \frac{z_1}{z_2}$.

a. Écrire z_1 , z_2 et Z sous forme trigonométrique.

b. Écrire Z sous forme algébrique et en déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.

Propriété 4 : nombres complexes et géométrie

1. Soit A et B deux points du plan complexe d'affixes respectives alors $AB = \left| z_{\overrightarrow{AB}} \right|$
2. Soit A et B deux points distincts du plan complexe, alors $\left(\vec{u}; \overrightarrow{AB} \right) = \arg \left(z_{\overrightarrow{AB}} \right)$

Remarque

Grâce aux nombres complexes, on est capable d'évaluer l'angle $\left(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{CD} \right)$

En effet :

Exemple 4

On se place dans le plan complexe muni du repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

1. On considère les points A, B et C d'affixes $z_A = -6 + 2i, z_B = 6 + 8i$ et $z_C = -10i$.
Déterminer la nature du triangle ABC .
2. Même question avec les points A, B et C d'affixes $z_A = -1 + i\sqrt{3}, z_B = 2$ et $z_C = -1 - i\sqrt{3}$.
3. On considère les points A, B et C d'affixes $z_A = -4 + i, z_B = -1 + 2i$ et $z_C = -5 + 4i$.
Déterminer la forme algébrique du quotient $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$ et en déduire la nature du triangle ABC .
4. Même question avec les points A, B et C tels que $z_A = 3 - 2i, z_B = -3 - 4i$ et $z_C = 1 + 4i$.
5. Soit M un point d'affixe z . Déterminer et représenter l'ensemble des points M vérifiant $|z - 3i| = 2$.
6. Même question avec $|z + 1 - 2i| = 3$.
7. Même question avec $|z - 1 + 4i| = |z + 3 + i|$.
8. Même question avec $|z + 3 - 5i| = |z - 4 + i|$.
9. Même question avec $\arg(z) = \frac{\pi}{2}$.
10. Même question avec $\arg(z) = -\frac{2\pi}{3}$.
11. On considère les points A, B et C tels que $z_A = 1 + 2i, z_B = 5 + 4i$ et $z_C = 4 + 11i$
Déterminer une mesure de l'angle $\left(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC} \right)$
12. Même question avec $z_A = -6 + 4i, z_B = 8 - i$ et $z_C = 4 - 2i$ et l'angle $\left(\overrightarrow{CA}; \overrightarrow{CB} \right)$

2 Forme exponentielle d'un nombre complexe

Définition 5 : forme exponentielle d'un nombre complexe

Soit z un nombre complexe non nul de module r et d'argument θ .
L'écriture $z = re^{i\theta}$ est appelée écriture ou forme exponentielle du complexe z

Remarque

Si on dérive la fonction définie par $f(\theta) = \cos\theta + i\sin\theta$, on obtient $f'(\theta) = if(\theta)$.
Ceci explique que nous notons $\cos\theta + i\sin\theta = e^{i\theta}$.

Propriété 5 : propriétés avec la forme exponentielle

Soit $(r, r') \in \mathbb{R}^2$, $(\theta, \theta') \in \mathbb{R}^2$ et $n \in \mathbb{N}$.

1. $re^{i\theta} \times r'e^{i\theta'} = rr'e^{i(\theta+\theta')}$
2. Si $r \neq 0$ alors $\frac{1}{re^{i\theta}} = \frac{1}{r}e^{-i\theta}$
3. Si $r \neq 0$ alors $\frac{r'e^{i\theta'}}{re^{i\theta}} = \frac{r'}{r}e^{i(\theta'-\theta)}$
4. $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$
5. $\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$
6. $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$

Exemple 5

1. Déterminer un module et un argument des nombres complexes suivants :

$$z_1 = e^{-i\pi/2} \quad z_2 = -2e^{-i\pi/4} \quad z_3 = -4e^{-4i\pi} \quad z_4 = -ie^{i\pi}$$

2. Même question avec ;

$$z_5 = e^{3i\pi/2} \quad z_6 = -5e^{4i\pi/3} \quad z_7 = -3e^{-5i\pi/6} \quad z_8 = 4ie^{5i\pi/3}$$

3. Donner l'écriture exponentielle des nombres complexes suivants :

$$\begin{aligned} z_1 &= 1+i & z_2 &= -\sqrt{3} & z_3 &= 5i & z_4 &= -8i \\ z_5 &= -1+i & z_6 &= -\frac{2}{\sqrt{3}}(1+i) & z_7 &= (-1+i)(\sqrt{3}+i) & z_8 &= \frac{-2+2i}{1-i\sqrt{3}} \end{aligned}$$

4. Même question avec :

$$\begin{aligned} z_1 &= 2-2i & z_2 &= -\frac{2}{5}i & z_3 &= 1+\sqrt{3} & z_4 &= -\sqrt{2}i \\ z_5 &= -3+3i & z_6 &= -5(1-i) & z_7 &= (1+i)(1-\sqrt{3}i) & z_8 &= \frac{1-i}{\sqrt{3}+i} \end{aligned}$$

Exemple 6

1. Soit $z_1 = 3\sqrt{3} - 3i$ et $z_2 = 2 - 2i$.
 - a. Écrire z_1 et z_2 sous forme exponentielle.
 - b. Écrire $\overline{z_1}$, $\overline{z_2}$, $z_1 \times z_2$ et $\frac{z_1}{z_2}$ sous forme exponentielle.
 - c. Écrire $(z_1)^{10}$ et $(z_2)^4$ sous forme exponentielle.
2. Même question avec $z_1 = -3 + 3i$ et $z_2 = 5 - 5\sqrt{3}i$
3. Déterminer la forme exponentielle de $z = \frac{(1+i)^3}{1-i} - \frac{(1-i)^4}{(1+i)^2}$
4. Même question avec $z = \frac{(1+\sqrt{3}i)^2}{(1-\sqrt{3}i)^3} - \frac{(1-\sqrt{3}i)^2}{(1+\sqrt{3}i)^3}$