Chapitre 18 : Géométrie dans l'espace

1 Le produit vectoriel

Définition 1 : repère direct de l'espace

Soit un observateur se tenant debout, dans l'axe $(O, \vec{k})$, les pieds en O et regardant le point I.

Un repère est dit "direct" si, l'observateur a le point J à sa gauche. Il est dit "indirect" dans le cas contraire.

Définition 2 : produit vectoriel

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace orienté.

On appelle produit vectoriel de $\vec{u}$ par $\vec{v}$ le vecteur noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$ défini par :

- lorsque $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$
- lorsque $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires,
 - $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$
 - $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base directe
 - $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times |\sin(\vec{u}, \vec{v})|$

Remarques

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux et unitaires, alors $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base orthonormée directe.
- Réciproquement, si $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base orthonormée directe, alors $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{w}$

Exemple 1

Le repère $(A, \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$ ci-contre construit à partir d'un cube est orthonormal direct.

Déterminer les vecteurs :

a) $\vec{AB} \wedge \vec{AE}$

b) $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$

c) $\vec{BD} \wedge \vec{AC}$

d) $\vec{AC} \wedge \vec{AG}$

Propriété 1 : colinéarité et alignement

Le produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est nul si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
Les points A, B et C sont alignés si et seulement si $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \vec{0}$.

Propriété 2 : aire d'un parallélogramme

L'aire du parallélogramme formé sur les côtés $[AB]$ et $[AC]$ est égale à $\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$.

Propriété 3 : propriétés du produit vectoriel

Quels que soient les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ et le réel k :

$$\begin{aligned}\vec{v} \wedge \vec{u} &= -\vec{u} \wedge \vec{v} \\ (k\vec{u}) \wedge \vec{v} &= k(\vec{u} \wedge \vec{v}) \\ \vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) &= \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w}\end{aligned}$$

Propriété 4 : produit vectoriel et base orthonormée directe

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormale directe.

On a :

$$\begin{aligned}\vec{i} \wedge \vec{i} &= \vec{j} \wedge \vec{j} = \vec{k} \wedge \vec{k} = \vec{0} \\ \vec{i} \wedge \vec{j} &= \vec{k} \quad \text{et} \quad \vec{j} \wedge \vec{i} = -\vec{k} \\ \vec{j} \wedge \vec{k} &= \vec{i} \quad \text{et} \quad \vec{k} \wedge \vec{j} = -\vec{i} \\ \vec{k} \wedge \vec{i} &= \vec{j} \quad \text{et} \quad \vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}\end{aligned}$$

Exemple 2

On considère l'espace muni d'une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ orthonormale directe.

Dans chacun des cas suivants, calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$:

1. $\vec{u} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$ et $\vec{v} = -2\vec{i} + \vec{k}$
2. $\vec{u} = -3\vec{i} - 2\vec{k}$ et $\vec{v} = 3\vec{i} + \vec{j}$
3. $\vec{u} = 4\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ et $\vec{v} = -2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$
4. $\vec{u} = -\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$ et $\vec{v} = -2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$

Propriété 5 : produit vectoriel et coordonnées

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormale directe.

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs de coordonnées (x, y, z) et (x', y', z') , alors $\vec{u} \wedge \vec{v}$ a pour coordonnées $(yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx')$.

Remarque

Pour calculer les coordonnées du produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$, il est commode de présenter ainsi :

Exemple 3

On considère l'espace muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ direct et les points

$A(-3; 1; 1)$, $B(1; 3; -2)$, $C(-4; -1; 3)$, $D(3; 2; 2)$, $E(-2; 5; 0)$ et $F(0; 4; 1)$.

Déterminer les coordonnées des vecteurs :

- a) $\vec{AB} \wedge \vec{AE}$ b) $\vec{BC} \wedge \vec{AD}$ c) $\vec{DE} \wedge \vec{AC}$ d) $\vec{FB} \wedge \vec{BD}$

2 Produit scalaire dans l'espace et applications

Remarque

On définit le produit scalaire de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace exactement de la même manière que dans le plan.

Seule l'expression avec les coordonnées dans l'espace change :

$$\text{Si } \vec{u}(x, y, z) \text{ et } \vec{v}(x', y', z') \text{ alors } \vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

Exemple 4

1. Soient les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ de coordonnées respectives dans une base orthonormée directe :

$$\vec{u} \left(-\frac{4}{9}; \frac{1}{9}; \frac{8}{9} \right), \vec{v} \left(\frac{4}{9}; \frac{8}{9}; \frac{1}{9} \right), \vec{w} \left(\frac{7}{9}; -\frac{4}{9}; \frac{4}{9} \right).$$

Montrer que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base orthonormale.

Est-elle directe ?

2. Même question avec les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ de coordonnées respectives dans une base orthonormée directe :

$$\vec{u} \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{2} \right), \vec{v} \left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{2} \right), \vec{w} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}; 0; -\frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

Définition 3 : vecteur normal à un plan

Un vecteur normal à un plan $(\mathcal{P})$ est un vecteur directeur d'une droite orthogonale à ce plan.

Définition 4 : plan orthogonal à un vecteur

Un plan est dit orthogonal à un vecteur si ce vecteur est un vecteur normal du plan.

Remarque

- Un vecteur normal est un vecteur non nul
- Tout vecteur non nul colinéaire à un vecteur normal d'un plan ($\mathcal{P}$) est aussi un vecteur normal de ce plan.
- Un vecteur normal au plan (ABC) est un vecteur orthogonal aux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
Ainsi le vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est vecteur normal du plan (ABC) .

Exemple 5

Déterminer un vecteur normal au plan (ABC) dans chacun des cas suivants :

1. $A(1, 1, 3), B(3, -1, 4)$ et $C(-2, 3, 1)$
2. $A(4, 0, -1), B(2, 1, -4)$ et $C(1, -2, 1)$

Propriété 6 : plan orthogonal et produit scalaire

Soit $\vec{n}$ un vecteur non nul et A un point de l'espace.

Le plan ($\mathcal{P}$) passant par A et orthogonal à $\vec{n}$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Propriété 7 : équations de plan

Un plan de vecteur normal $\vec{n}(a, b, c)$ a une équation de la forme $ax + by + cz + d = 0$.

Réciproquement, si a, b et c ne sont pas tous les trois nuls, l'ensemble des points $M(x, y, z)$ tels que $ax + by + cz + d = 0$ est un plan de vecteur normal $\vec{n}(a, b, c)$.

Exemple 6

1. Déterminer une équation du plan orthogonal à (AB) passant par C où on donne $A(2; 3; 1), B(-3; 1; 0)$ et $C(4; -1; 2)$.
2. Même question avec $A(-2; 1; -2), B(-3; 1; 4)$ et $C(4, 0; -1)$.
3. Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne $A(0; 1; -1), B(2; 1; -2)$ et $C(1; 0; -2)$.
Déterminer une équation du plan (ABC) .
4. Même question avec $A(2; 3; 2), B(5; 3; -1)$ et $C(1; 2; -2)$.

Définition 5 : distance d'un point à un plan

La distance d'un point A à un plan $(\mathcal{P})$ est AH où H est le projeté orthogonal de A sur $(\mathcal{P})$.

Propriété 8 : distance d'un point à un plan

La distance d'un point $A(x_A, y_A, z_A)$ au plan $(\mathcal{P})$ d'équation $ax + by + cz + d = 0$ est :

$$AH = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Remarque

Au lieu d'utiliser cette formule, on peut aussi chercher les coordonnées du point H , projeté orthogonal de A sur le plan, puis calculer la distance AH .

Exemple 7

Soit A, B, C et D quatre points de l'espace, dont les coordonnées dans un repère orthonormal sont respectivement $A(1; 0; 1)$, $B(-1; 2; 0)$, $C(0; 0; 3)$ et $D(1; 1; 1)$.

1. Déterminer une équation du plan (ABC) .
2. Déterminer les coordonnées du point H , projeté orthogonal de D sur le plan (ABC) .
3. En déduire la distance du point D au plan (ABC) .
4. Retrouver cette distance à l'aide de la formule donnant la distance d'un point à un plan.

Propriété 9 : équations de sphères

La sphère $(\mathcal{S})$ de centre $\Omega(x_0, y_0, z_0)$ et de rayon R admet une équation de la forme :

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$$

Propriété 10 : caractérisation de la sphère

La sphère ($\mathcal{S}$) de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

Exemple 8

1. Soient $A(2; -1; 0)$ et $B(-2; 4; 3)$.
 - a. Déterminer une équation de la sphère ($\mathcal{S}_1$) de centre A et de rayon 3.
 - b. Déterminer une équation de la sphère ($\mathcal{S}_2$) de centre A et passant par B .
 - c. Déterminer une équation de la sphère ($\mathcal{S}_3$) de diamètre $[AB]$.
2. Mêmes questions avec $A(0; 1; 2)$ et $B(-1; 0; 1)$.

3 Droites et systèmes de représentation paramétrique

Propriété 11 : équations paramétriques de droite

La droite ($\mathcal{D}$) passant par $A(x_0, y_0, z_0)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(a, b, c)$ est l'ensemble des points $M(x, y, z)$ vérifiant

$$\begin{cases} x = x_0 + ta \\ y = y_0 + tb \\ z = z_0 + tc \end{cases} \quad \text{avec } t \in \mathbb{R}.$$

Le système $\begin{cases} x = x_0 + ta \\ y = y_0 + tb \\ z = z_0 + tc \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$ est appelé représentation paramétrique de la droite (t est le paramètre).

Remarque

On retrouve très facilement ce système en écrivant que M appartient à la droite de vecteur directeur $\vec{u}$ et passant par A si et seulement si $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.

Exemple 9

1. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB) où $A(2; 7; -3)$ et $B(4; -1; 3)$.
2. Même question avec $A(3; -2; 5)$ et $B(7; -1; -8)$.
3. Soit ($\mathcal{D}$) la droite de représentation paramétrique $\begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = -2 + t \\ z = 1 - 5t \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$.
 - a. Les points $A(-2; -4; 13)$ et $B(7; -1; -4)$ appartiennent-ils à ($\mathcal{D}$) ?
 - b. La droite ($\mathcal{D}$) est-elle parallèle à la droite (AC) où $C(-8, -6, 23)$?
 - c. La droite ($\mathcal{D}$) est-elle orthogonale à la droite (BD) où $D(9, 2, -2)$?
 - d. Déterminer l'intersection de la droite ($\mathcal{D}$) avec le plan ($\mathcal{P}$) d'équation $2x - 3y + z = 4$.

Propriété 12 : système d'équations de droite

Une droite est l'intersection de deux plans donc lorsque (a, b, c) et (a', b', c') ne sont pas proportionnels l'ensemble des points $M(x, y, z)$ tels que

$$\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' = 0 \end{cases}$$

est une droite.

Remarque

Le système d'équations n'est pas unique. Une droite peut être définie de plusieurs façons comme l'intersection de deux plans.

Exemple 10

Soient $(\mathcal{P}_1)$ et $(\mathcal{P}_2)$ les plans d'équations respectives $x + y + z - 2 = 0$ et $x - 2y - z + 1 = 0$.

1. Justifier que l'intersection de $(\mathcal{P}_1)$ et $(\mathcal{P}_2)$ est une droite. On la note $(\mathcal{D})$.
2. Donner un système de représentation paramétrique de la droite $(\mathcal{D})$.
3. En déduire un vecteur directeur de $(\mathcal{D})$. Proposer une autre méthode pour trouver un vecteur directeur de $(\mathcal{D})$.

4 Exercice de synthèse

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère les trois points A, B et C de coordonnées respectives :

$$A(-1; 2; 1), B(1; -6; -1) \text{ et } C(2; 2; 2).$$

1.
 - a. Vérifier que les points A, B et C définissent bien un plan.
 - b. Montrer que le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan (ABC).
 - c. Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC).
2. Soit $(\mathcal{P})$ le plan d'équation : $x - y + z - 4 = 0$.
 - a. Montrer que les plans (ABC) et $(\mathcal{P})$ sont sécants.
 - b. Soit $(\mathcal{D})$ la droite intersection des plans $(\mathcal{P})$ et (ABC). Déterminer une représentation paramétrique de la droite $(\mathcal{D})$.
3. On considère la sphère $(\mathcal{S})$ de centre $\Omega(3; 1; 3)$ et de rayon 3 et on nomme I le point de coordonnées $(2; -1; 1)$.
 - a. Montrer que le point I appartient à la droite $(\mathcal{D})$.
 - b. Montrer que le point I appartient à la sphère $(\mathcal{S})$.
 - c. Montrer que la droite $(\mathcal{D})$ coupe la sphère $(\mathcal{S})$ en un deuxième point.